



Comment planter... Les framboisiers

INFO


Il existe deux types principaux de framboisiers, ceux qui donnent des fruits en été sur les nouvelles pousses de l'année précédente, et ceux qui donnent des fruits plus tard sur les pousses de la même année.

CLIMAT ET QUALITÉ DU SOL

Les framboisiers nécessitent un emplacement ensoleillé voire mi-ombragé. En ce qui concerne le climat, les framboisiers sont relativement peu exigeants, pour peu que le sol leur convienne. Leurs racines sont étalées et peu profondes, elles aiment les sols riches en humus, chaud, acides à neutres.

PÉRIODE DE PLANTATION ET ESPACEMENT


De nos jours, les framboisiers sont presque exclusivement vendus en conteneurs. Il est donc possible de les planter toute l'année, sauf si le sol est gelé. On plantera les framboisiers d'automne de préférence au printemps, dans des buttes de terre mélangée à du compost. Pour la plantation en rangées, respecter un espacement de 33 à 40 cm entre les plantes, soit environ 3 plantes au mètre courant. Entre deux rangées, laisser 120 à 150 cm.



A

PLANTATION

- A
- Bien arroser les plants avant de les mettre en terre.
 - Bien ameublir la terre sur la ligne de plantation, la mélanger avec du compost bien mûr ou/et du compost d'écorce. Sur toute la longueur prévue, former une butte de 1 m de large et de 30 à 50 cm haut. Ajouter 80 g d'engrais pour baies au mètre carré.
 - Faire tremper la motte avec les racines, éventuellement avec le conteneur, dans un seau d'eau.
 - Débarrasser la motte du conteneur.
 - Placez plante dans le trou de sorte que la surface supérieure de la motte arrive au ras de la surface du sol. Ne pas recouvrir de terre supplémentaire!
 - Arroser abondamment.
 - Pour les framboises d'automne, préparer un support comme sur le dessin.



- B** – Une autre alternative consiste à tendre un grillage dont les mailles font 15 à 20 cm à 80 cm du sol environ. En grandissant, les pousses passeront dans le grillage et il ne sera pas nécessaire de les attacher.

TAILLE ET SOINS

C Pour les framboisiers d'été, couper les pousses qui ont porté des fruits au ras du sol juste après la récolte et les éliminer immédiatement. Brûler les pousses qui présentent des signes de maladie. Laisser 10 à 15 jeunes pousses fortes par mètre courant et les attacher. Pour les framboises d'automne, toutes les pousses sont coupées à ras du sol en hiver. Les nouvelles pousses apparaîtront au printemps.

Apport d'engrais : Répandre une poignée par mètre carré (60 g environ) d'engrais spécial pour baies entre mars et avril. Il est conseillé de recouvrir le sol de mulch. Afin de maintenir la forme de butte, lui redonner tous les deux ans du compost bien mûr ou de l'humus d'écorce, mais pas plus de 2 à 3 l au m².

Travail du sol. Les racines des framboisiers poussent en s'étalant, le sol ne doit être bêché que superficiellement pour ne pas les endommager. Le mieux est de recouvrir la butte d'une feuille adéquate. Elle empêchera les mauvaises herbes de pousser, maintiendra le sol humide et le réchauffera plus rapidement quand le soleil brillera.

